

## PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

**Před použitím si přečtete přiložený návod k použití.**

### SHARPEN®40 SC

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů v široké škále plodin: ozimé obilniny, kukuřice, hrách, fazol, sója, slunečnice, lupina, cibule z výsevu a cibule sazečka, česnek, pór, mrkev, petržel, celer, rajče, košťálová zelenina, jahodník ananasový, réva, jádroviny, peckoviny, tabák, trávy – množitelské porosty a k inhibici bočních výhonů tabáku.

**Kategorie uživatelů:** Profesionální uživatel

**Název a množství účinné látky:** Pendimethalin 400 g/l (38 % hmot), tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene

**Název nebezpečné látky:** -

**Označení přípravku:**



**VAROVÁNÍ**

**H410** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P235 Uchovávejte v chladu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah /obal předáním oprávněné osobě.

**EUH208** Obsahuje pendimethalin a 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci

**EUH401** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

**Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné**

**Označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:**

Sharda Cropchem Limited, Prime, Business Park, Dashrathal Joshi  
Road, Vile Parle, (West), 400056 Mumbai, Indie

**Právní zástupce:**

Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril  
Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Španělsko, Telefonní číslo:  
+34868127589

|                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidenční číslo přípravku:</b>  | <b>5025-0</b>                                                                                                         |
| <b>Číslo šarže:</b>                | uvedeno na obalu                                                                                                      |
| <b>Datum výroby formulace:</b>     | uvedeno na obalu                                                                                                      |
| <b>Doba použitelnosti:</b>         | 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +20 °C                                                                |
| <b>Datum expirace:</b>             | uvedeno na obalu                                                                                                      |
| <b>Množství přípravku v obalu:</b> | 500 a 1000 ml; 5; 10 a 20 L HDPE/PA láhev nebo kanistr<br>500 a 1000 ml; 5; 10 a 20 L HDPE/EVOH láhev nebo<br>kanistr |

**® Registrované obchodní známky a logotypy společnosti Sharda Cropchem Limited**

**Způsob působení:**

**Sharpen 40 SC®** je postřikový herbicid k hubení jednoletých jednoděložných a jednoletých dvouděložných plevelů. Obsahuje účinní látku pendimethalin patřící do chemické skupiny dinitroanilinů, která inhibuje dělení buněk. Aplikován preemergentně, pendimethalin je účinný na některé důležité jednoleté jednoděložné plevele, jakož i na širokou škálu dvouděložných plevelů. Při postemergentní aplikaci, Pendimethalin je účinný především na širokolisté plevele.

**Návod k použití/rozsah povoleného použití:**

| 1) Plodina, oblast použití. | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití                                 | Dávkování, mísitelnost | OL | Poznámka<br>1) k plodině<br>2) k ŠO<br>3) k OL                                                                                                                                      | 4) Pozn. k dávkování<br>5) Umístění<br>6) Určení sklizně |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Celer, rajče                | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevele<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha         | AT | 1) před výsadbou<br>2-3 dni<br>2) preemergentně                                                                                                                                     | 4) se<br>zapravením<br>za sucha<br>5) pole               |
| Cibule z výsevu, pór        | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevele<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha         | AT | 1) preemergentně<br>2) preemergentně                                                                                                                                                | 5) pole                                                  |
| Cibule ze sazečky, česnek   | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevele<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha         | AT | 1) po výsadbě<br>před vzejitím<br>nebo,<br>postemergentně<br>min. 2,5-3 listy<br>2) preemergentně,<br>postemergentně<br>jednoděložné<br>max. BBCH 11,<br>dvouděložné max.<br>BBCH12 | 5) pole                                                  |
| Fazol, mrkev, petržel       | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevele<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha         | AT | 1) preemergentně<br>do 2-3 dnů po<br>zasetí 2)<br>preemergentně                                                                                                                     | 5) pole                                                  |
| hrách setý                  | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevele                             | 4,1 l/ha               | AT | 1) preemergentně<br>2-3 dny po zasetí                                                                                                                                               |                                                          |

|                                                             |                                                                          |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                             | dvouděložné<br>jednoleté                                                 |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| Jádroviny,<br>peckoviny                                     | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 4,1 - 5 l/ha                                                                    | AT                | 2) preemergentně                                                                                                                                                                      |                                                         |
| jahodník<br>ananasový                                       | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha                                                                  | AT                | 1) před vzejitím<br>plevelů nebo, před<br>výsadbou<br>2) preemergentně                                                                                                                | 4) se<br>zapravením 5)<br>pole                          |
| pšenice<br>ozimá,<br>ječmen<br>ozimý,<br>tritikale<br>ozimé | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha<br>psárka, svízel,<br>heřmánkovec –<br>4,1 l/ha<br>preemergentně | AT                | 1) preemergentně<br>do 2 dnů po zasetí<br>nebo,<br>postemergentně<br>BBCH 13-21<br>2) preemergentně,<br>postemergentně<br>jednoděložné<br>max. BBCH 11,<br>dvouděložné max.<br>BBCH12 |                                                         |
| kukuřice setá                                               | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha                                                                  | AT                | 1) před setím<br>nebo,<br>preemergentně do<br>2 dnů po zasetí<br>2) preemergentně                                                                                                     | 4) se<br>zapravením<br>za sucha                         |
| lupina bílá,<br>lupina žlutá                                | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha                                                                  | AT                | 1) preemergentně<br>do 3 dnů po zasetí<br>2) preemergentně                                                                                                                            |                                                         |
| réva                                                        | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 4,1 – 5 l/ha                                                                    | AT                | 2) preemergentně                                                                                                                                                                      |                                                         |
| slunečnice<br>roční                                         | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 5 l/ha                                                                          | AT                | 1) před setím<br>2) preemergentně                                                                                                                                                     | 4) se<br>zapravením<br>za sucha                         |
| sója luštinatá                                              | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha                                                                  | AT                | 1) před setím<br>2) preemergentně                                                                                                                                                     | 4) se<br>zapravením<br>za sucha                         |
| tabák<br>virginský,<br>zelenina<br>košťálová                | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha                                                                  | AT<br>56*<br>21** | 1) před výsadbou<br>zeleniny 2-3 dny,<br>tabáku 2 dny<br>2) preemergentně                                                                                                             | 4) se<br>zapravením<br>nebo bez<br>zapravení<br>5) pole |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                      |    |                                                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| tabák<br>virginský                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inhibice bočních<br>výhonů                                               | 1 % (500 l,<br>vody) | AT | 1) ve f. plně<br>vyvinuté listy, po<br>objevení prvních<br>květů                                   |                       |
| bojínek<br>luční, jílek<br>jednoletý,<br>jílek<br>mnohokvětý,<br>jílek<br>vytrvalý,<br>kostřava<br>červená,<br>kostřava<br>luční,<br>kostřava<br>ovčí, lipnice<br>luční, metlice<br>trsnatá, ovsík<br>vyvýšený,<br>pohánka<br>hřebenitá,<br>psárka luční,<br>psineček<br>tenký, srha<br>laločnatá,<br>trojštět<br>žlutavý | plevele<br>jednoděložné<br>jednoleté, plevle<br>dvouděložné<br>jednoleté | 3,3 – 4,1 l/ha       | AT | 1) od: 14 BBCH<br>2) postemergentně<br>jednoděložné<br>max. BBCH 11,<br>dvouděložné max.<br>BBCH12 | 6) semenné<br>porosty |

\*kapusta

\*\*kedlubna

AT – ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

OL (ochranná lhůta) je daná počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

| Plodina, oblast použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dávka vody   | Způsob aplikace | Max. počet aplikací v<br>plodině |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| bojínek luční, celer, česnek, fazol,<br>hrách setý, ječmen, jílek jednoletý,<br>jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý,<br>kostřava červená, kostřava luční,<br>kostřava ovčí, kukuřice setá, lipnice<br>luční, lupina bílá, lupina žlutá,<br>metlice trsnatá, mrkev, ovsík<br>vyvýšený, petržel, pohánka<br>hřebenitá, pór, psárka luční,<br>psineček tenký, pšenice, rajče,<br>slunečnice roční, sója luštinatá,<br>srha laločnatá, tritcale, trojštět<br>žlutavý, zelenina košťálová, tabák<br>virginský | 400-600 l/ha | postřik         | Max. 1x                          |
| jádroviny, jahodník ananasový,<br>peckoviny, réva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400-600 l/ha | postřik         | max. 1x za rok, na<br>jaře       |

Zákazy a omezení:

| Plodina, oblast použití | Zákaz, omezení    |
|-------------------------|-------------------|
| celer                   | mimo celer naťový |

### **Upřesnění použití:**

V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2-3 cm lehkými branami.

V ozimých obilninách se SHARPEN 40 SC aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. SHARPEN 40 SC se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, BBCH 13-21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů.

Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přituly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít Sharpen 40 SC preemergentně v dávce 4,1 l/ha.

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi se SHARPEN 40 SC používá preemergentně do 2-3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a v sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením.

V póru a cibuli seté se SHARPEN 40 SC aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule ze sazečky a v česneku se aplikuje při výsadbě před vzejitím. SHARPEN 40 SC je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5 - 3 listy.

Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčat a celeru se aplikuje 2-3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení.

**Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!**

Ve výsadbách košťálové zeleniny se SHARPEN 40 SC aplikuje 2-3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách tabáku se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. SHARPEN 40 SC může být také použit k ničení pazochů. SHARPEN 40 SC ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů.

V travách na semeno se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy. Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.

V lupině bílé a lupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V sadech jaderovin a peckovin, ve vinicích se SHARPEN 40 SC aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Rizika vzniku rezistence a strategie pro předcházení vzniku rezistence

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

### **Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:**

**Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů**

| Plodina                                                                                                                                                                         | bez<br>redukce | tryska<br>50 % | tryska<br>75 % | tryska<br>90 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]</b>                                                                                         |                |                |                |                |
| Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy                              | <b>4</b>       | <b>4</b>       | <b>4</b>       | <b>4</b>       |
| Ozimé obiloviny                                                                                                                                                                 | <b>10</b>      | <b>4</b>       | <b>4</b>       | <b>4</b>       |
| <b>Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]</b>                                                                           |                |                |                |                |
| Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, vinná réva, ovocné sady, ozimé obiloviny, trávy | <b>5</b>       | <b>5</b>       | <b>5</b>       | <b>5</b>       |

Pro aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy:

**Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $<10$  m.**

Pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, slunečnice a ozimých obilovin:

**Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( $\geq 3^\circ$  svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod  $<20$  m.**

#### **Další omezení:**

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

#### **Příprava aplikační kapaliny:**

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“

#### **Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:**

„Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“

#### **Čištění aplikačního zařízení:**

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

#### **Osobní ochranné pracovní prostředky:**

Při přípravě a aplikaci

|                          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana dýchacích orgánů | není nutná.                                                                                                                                                                                            |
| Ochrana rukou            | gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1                                                          |
| Ochrana očí a obličeje   | Není nutná                                                                                                                                                                                             |
| Ochrana těla             | celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 / resp. ČSN EN 340 |
| Dodatečná ochrana hlavy  | není nutná                                                                                                                                                                                             |
| Dodatečná ochrana nohou  | pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)                                                |
| Společný údaj k OOPP     | poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.                                                                                                                                  |

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice a brýle pro případ poruchy zařízení.

#### **Další označení z hlediska ochrany zdraví člověka:**

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Vstup na ošetřené pozemky je možný po zaschnutí.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

#### **Informace o první pomoci:**

**Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže (alergická reakce) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.

**První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:** Přerušete práci a přejděte mimo ošetřovanou oblast.

**První pomoc při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

**První pomoc při zasažení očí:** Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, a současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

**První pomoc při náhodném požití:** Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

#### **Skladování**

Přípravek skladujte v těsně uzavřených neporušených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách + 5 až + 20 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Chraňte světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah dětí.

#### **Likvidace obalů a zbytků**

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou +1200

- +1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin.

Přípravek, jeho zbytky a obaly po použití se nesmí dostat do povrchové vody. Zabraňte uvolnění do vodního prostředí. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se zředí v poměru 1:5 a beze zbytku se vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmějí však zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů jako v případě obalů.

#### **Další údaje a upřesnění:**

**Distributor v ČR:** SHARDA CROP-CHEM LIMITED odštěpný závod, Mostní 73, 280 02 Kolín, Tel.: +420 725 30 40 40

#### Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.

Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě při správném naředění.

#### Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem sody a propláchněte vodou v souladu s návodem na jeho použití. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod!

#### Rizika fytotoxicity

Přípravek aplikovaný v souladu s návodem na použití a v doporučených dávkách nepůsobí fytotoxicky.

#### Následné plodiny

Vliv na následné plodiny se neočekává, protože aktivní pendimethalin je degradován v časovém rámci běžného střídání zemědělských plodin.

#### Náhradní plodiny

V případě, že plodina musí být zaorána po zimě nebo na jaře, pro opětovný výsev lze doporučit jarní obiloviny.

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.